

Les indicateurs présentés ci-dessous ont été élaborés par les partenaires du Contrat d'Objectif « La Normandie en transition agroécologique ». **Les indicateurs en gras sont ceux sur lesquels la pratique présentée exerce une influence favorable.** Vous pouvez retrouver l'ensemble des indicateurs et le détail de leur construction via ce lien : [Indicateurs-AE-COB3](#)

ÉCONOMIQUE	SOCIAL	ENVIRONNEMENTAL
Autonomie décisionnelle	Vivabilité - Emploi	Surfaces d'intérêt agroécologiques - Fertilisation
Sensibilité aux aides	Acceptabilité sociale	Part d'herbe dans la SAU - Autonomie alimentaire
Santé financière de l'exploitation	Rentabilité du travail	Produits phytosanitaires – Diversité des espèces

Contexte et objectif

Face à la difficulté des chevriers laitiers à valoriser leurs chevreaux, plusieurs éleveurs du groupe CIVAM petits ruminants se sont questionnés sur la pratique des lactations longues. Certains d'entre eux, comme Corinne installée près de Bayeux sur un petit élevage de 38 alpines la pratiquent depuis plusieurs années.

L'objectif pour Corinne :

- Dégager de la trésorerie toute l'année
- Assurer la disponibilité de ses produits toute l'année sur les marchés
- Préserver la santé du troupeau (moins de casse, moins de frais vétérinaires, longévité du troupeau...)
- Pas de pression sur le renouvellement car le troupeau vieillit mieux
- Limiter le nombre de chevreaux difficilement valorisables
- Moins de travail à la période des mises bas
- Gain en coût d'élevage des chevrettes

Les inconvénients :

- Traite toute l'année (plus de période tarissement)
- Moins bonne valorisation de la bonne génétique des meilleures chèvres
- Mises bas plus compliquées quand elles ne sont pas régulières : portées multiples (beaucoup de triplés), toxémie de gestation

Description - mise en oeuvre

Elle pratique la lactation longue sur toutes ses chèvres : sur son troupeau de 38 CL, seulement 3 ou 4 partent à la reproduction tous les ans car elles ne tiennent pas en lait.

Les chevrettes sont mises à la reproduction dès 1 an et restent en lactation pour celles qui tiennent en lait, ce qui leur permet de terminer leur croissance sans l'épreuve physique de nouvelles mises bas.

Elle permet également aux chèvres les plus vieilles de prolonger leur carrière laitière en ne les remettant pas à la reproduction : certaines vieilles chèvres ont 11 ans et sont en lactation longues depuis 4 ans.

La lactation longue ne l'empêche pas d'être en mono-traite de fin août jusqu'aux mises-bas suivante.

Reproductibilité

La lactation longue peut se pratiquer uniquement sur des chèvres qui sont en forme. Le troupeau de Corinne est indemne CAEV, pas de problème de parasitisme, ses chèvres sont nourries 3 fois par jour avec du foin de prairies naturelles très appétent et des concentrés, et elles pâturent dès les beaux jours.

Le niveau de production laitière doit être correct en fin de saison : « si en fin de saison je ne traie qu'1/2 verre de lait, ça ne sert à rien d'insister »

En images



En savoir +

RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS CAMPAGNES VIVANTES

Sandrine LEPETIT, animatrice

02 31 68 80 58

Sandrine.lepetit@civam.org